




Bio-Frequenz-Center

für Frequenztherapie

nach Dr. Clark, Dr. Rife, Dr. Baklayan u.a. Verfahren



Erreger:	Toxoplasma gondii – Toxoplasmose Erreger
Beschreibung:	Toxoplasma gondii ist ein obligat intrazelluläres Protozoon. Die Toxoplasmen treten in drei Entwicklungsstufen auf.
Übertragung:	Der Erreger wird oral in Form von Zysten (rohes und unzureichend erhitztes Fleisch) aufgenommen. Bei Erstinfektion in der Schwangerschaft kann der Erreger transplazentar übertragen werden.
Pathogenese:	Die Parasiten durchdringen die Darmwand, generalisieren hämatogen und manifestieren sich in Organen, bevorzugt im retikuloendothelialen System, wo sie sich intrazellulär durch Zweiteilung vermehren und schließlich die Wirtszellen zerstören. In Skelett- und Herzmuskulatur sowie in Gehirn und Retina bilden sich Zysten, in denen Erreger überdauern.
Klinik:	Nach einer Inkubationszeit von 1-3 Wochen kommt es zu leichten Allgemeinerscheinungen, wie Fieber, Mattigkeit, Arthralgie und Myalgien. In 80-90% verläuft die Infektion asymptomatisch. Die häufigste Organmanifestation ist der Lymphknotenbefall. Im Verlauf der Erkrankung entwickeln sich, bedingt durch die induzierte Immunantwort, Toxoplasmen-Zysten und verkalkte Entzündungsherde. Sie sind z.B. im Gehirn, Retina, Herz- und Skelettmuskulatur nachweisbar. Nach wenigen Monaten verschwinden die Beschwerden i. d. R. von selbst; es entsteht eine meist lebenslange latente Infektion. Bei Schwächung des Immunsystems kann die Infektion aus den Zysten reaktiviert werden, was eine lokale Gewebeschädigung und eine Ausbreitung der Toxoplasmen nach sich zieht. Es entwickelt sich meist eine Enzephalitis, die durch lokale Krampfanfälle oder neurologische Ausfälle gekennzeichnet ist.
Diagnostik:	Erreger- bzw. Antigennachweis gelingt selten. Die Labordiagnostik stützt sich auf Antikörperbestimmung.
Prävention:	Die Verhinderung einer Erstinfektion in der Schwangerschaft. Expositionsprophylaxe, Schwangere sollten auf rohes oder unzureichend erhitztes Fleisch verzichten.
Therapie:	Behandelt wird die bestehende Symptomatik und bei Erstinfektion in der Schwangerschaft. Mittel der Wahl ist Pyrimethan in Kombination mit einem Sulfonamid oder Clindamycin.
Unterstützende naturheilkundliche Therapie:	symptomatische Linderung der Symptome und Stabilisierung des Immunsystems. siehe Link zum Shop: www. boi-frequenz-center.de Juglandis Nieren Saft Leber Saft

	Papaya Seed
Unser spezieller Service:	Energetische Blut- und Haaranalysen aller Erreger. Nähere Informationen und Frequenzen auf Nachfrage. Wir beraten Sie gerne. Nehmen Sie einfach Kontakt auf: E-Mail: service@carica-deutschland.de